GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Etapas de la enfermedad por coronavirus 2019



	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Datos clínicos	• Malestar general • Fiebre (>37.5 °C) • Tos seca • Diarrea • Cefalea	• Disnea • Hipoxia (PaO_2 /FiO_2 ≤300 mmHg) (Presión arterial de oxígeno/ fracción inspirada de oxígeno milímetros de mercurio)	• Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda • Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica • Falla cardiaca
Datos paraclínicos	• Linfopenia • Aumento del tiempo de protrombina • Incremento del dímero D • Incremento leve de LDH (lactato deshidrogenasa)	• Imágenes radiográficas anormales • Aumento de las transaminasas • Niveles normales o disminuidos de procalcitonina	• Elevación de los marcadores inflamatorios PCR (proteína C reactiva), LDH, IL-6 (interleucina 6), dímero D, ferritina • Elevación de la troponina • Elevación de NT-proBNP (fragmento aminoterminal del propéptido natriurético de tipo B)
Terapias potenciales	Remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, transfusiones plasmáticas de pacientes convalecientes		
	Reducir inmunosupresión	Corticosteroides, inmunoglobulina humana, inhibidores de IL-6, inhibidores de IL-2 (interleucina 2), inhibidores de la cinasa Janus (JAK)	

Bibliografía: Hasan K, Siddiqi MD, Mandeep R, Mehra. MD COVID-19 Illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal en Journal of herar and lung transplantation. [Internet]. Buenos Aires, Argentina: IntraMed; 2020. Disponible en: https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95766